Lake Qarun. . . . The PAST and the **PRESENT Our SSG Experience at LQPA And Environmental Awareness** Program

The state of the The

What is an SSG?

- SSGs are a group of voluntary individuals who promote conservation and sustainable development at IBAs and other key biodiversity sites.
- The volunteers, despite varied backgrounds, ages & occupations they have similar interest and good understanding of natural resources.
- They provide a mechanism by which limited resources can be utilized efficiently & equitably.
- They provide a link between local communities and national institutions and government agencies
- They provide a mechanism for developing & empowerment thus allowing people to take control, manage and benefit from their own natural resources & to plan their own livelihoods.













مجموعة الدعم المجتمعي لمحمية قارون فلنعمل لاليوم معا.... لغر أفضل fe



انشطة المشروع:

القيام بانشطة لزيادة الوعي بقيمة الموارد البيئية بالمحمية.


- تقييم حالة أسراب الطيور بالمحمية (حجم المستعمرات، وتربية الاعداد، وأنواع الطيور
 المختلفة ومستعمرات النورس، والمرض) وتدريب أفراد المجتمع المحلي على رصد الطيور.
 تطوير البرامج المدرسية وذلك عن طريق تثقيف الطلاب حول مفاهيم الحفاظ علي البيئة وأخذهم لرحلات لمشاهدة الطيور) اختيار ٢ من المدارس وتعليم الطلاب لتقديم ملاحظاتهم حول الطيور التي يجدوها في الكتيب الخاص بهم).
- التركيز على السياحة البيئية والمرتبطة بها منافع اقتصادية ولأفراد المجتمع وتدريبهم على المشاركة في الأنشطه ذات الصلة بهذا المجال.
 - اجتماعات مع الصيادين لنشر الوعي البيثي.
 تنظيم احتضالية ودعوة جميع المشاركين بالمشروع.



لمزيد من المعلومات رجاء الإتصال، بمحمية قارون تليفون، ١٨٣٠٥٣٩ ٨٤٠

www.ncegypt.org info@ncegypt.org miracleseg@yahoo.com

مجمــوصـة الدصـم المجتمعــي لمحميـة قـارون والمنـاطـق الهـامـة للطيـور





























الطيور الشائعة في بحيرة قارون Common Birds of Lake Qarun



Larus genei نورس قرقطي Slender-billed gull

الطول 43 سم. أحد أنواع النوارس التي يكثر تواجدها شتاء بأعداد كبيرة في بحيرة قارون، و يبقى الكثير منه في الصيف فهناك مستعمرة كبيرة منه تتكاثر بملاحة بور فزاد. يتميز بمنقاره الطويل الرفيع الأحمر و رأسه الانسيابي.

الطول 92 سم. شائع الوجود في الشتاء و

مهاجر عبر الشواطئ و البحيرات الساحلية.

يتربص بفريسته فيبقى ساكنا ً بلا حراك حتى

إذا لمحها طعنها بمنقاره بلتهم وجبات متتوعة

Himantopus himantopus

Black-winged stilt

من الأسماك و الضفادع و الحشرات.

بلشون رمادى

أبو مغازل

Ardea cinerea

Grey Heron



Bubulcus ibis Cattle egret

الطول 50 سم. يتغذى على الديدان و ينقى الأرض




من الحشرات الضارة بالزراعة و لذلك أطلق عليه اسم "صديق الفلاح"، و هو طائر محمى بالقانون.



ابه ملعقة

AL AL









الطول 56 سمر زائر شتوى شائع، القليل منه يتكاثر في مصر . يتصيد فريسته من الأسماك و الحشرات في الماء الضحل. يتميز بأقدامه الصفراء. يعشش في مستعمر ات.





صياد السمك الابقع Pied kingfisher

الطول 28 سم. طائر مقيم يرى عادة فوق أسلاك التليفونات حول البحيرات الشمالية و على ضغاف نهر النيل يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على الأسماك في غذائه. عند الصيد يحلق مرفرفا ً في مكان واحد قبل أن ينقض بسرعة على فريسته.





حمام جبلى

Tringa totanus Redshank طيطوى أحمر الساق

الطول 28 سم. طائر مهاجر و زائر شتوى شائع تشيط يجرى بسرعة على الشواطئ الطينية حيث يتغذى على مختلف الحيوانات الصغيرة كالديدان و الرخويات و الحشر ات. يتميز بمنقاره و أرجله الطويلة ذات اللون الأحمر.



Hoplopterus spinosus

الطول 26 سم. يرى غالبا ً في أزواج. أدرج

ضمن الطيور النافعة للزراعة لأنه يتغذى

على الحشر أت و بذور النباتات الطفيلية. دائم

اليقظة و الحذر، فيطلق صرخات عالية عند

زقزاق

الاقتراب من عشه

Spur winged plover

Hirundo rustrica عصفور الجنة Swallow

الطول 19 سم. طائر مقيم كثير العدد و مهاجر عابر . يتميز الصنف الذي يستوطن مصر بلون بطنه الأحمر الصدئي. يتغذى على الحشرات في أثناء طيرانه. يبنى عشه من الطين.




شانع، و هو صغير الحجم قصير الأرجل و المنقار، نشيط دانب الحركة و الحرى بحثًا عن الحشرات و الحيوانات المائية الصغيرة التي يتبينها ببصره يتغذى على الحشرات و التشريات و الرخويات. يرى غالبا في أسراب asula



الطول 13 سم. طائر مهاجر و زائر شتوى







قطقاط مطوق صغير. Little ringed plover

الطول 19 سم. زائر شتوى بأعداد كثيرة و مهاجر عابر. يوجد في مجموعات صغيرة و أيضا ً في أسراب كبيرة. يتبين بحاسة البصر فرانسه من المثرات و القثريات التي تعيش قرب سطح الطين.





Gallinula chloropus Common Moorhen فرخة الماء

الطول 33 سم طلار مقيم شائع يستوطن أدغال الغابة على الشواطئ يلتقط طعامه من الحشر ات و النباتات على الأرض و في الماء. سباح ماهر و قد يغوص أحيانًا في الماء بحثًا عن الغذاء. يبنى عشه فوق النباتات الطافية أو على الأرض خافيا اياه بين الغاب.



Little green bee-eater فضبر

الطول 25 سم. أحد الطيور المصرية المميزة. يرى في جماعات صغيرة. يجثم على أسلاك التليفونات أو فوق الأشجار و منها ينقض على فرانسه من الحثرات التي يصيدها طائرا ً. يعشش في حفر في الأرض.



Squacco heron

الطول 48 سم. طائر مقيم يتوالد في أعداد صغيرة، و شانع أيضا كطائر مهاجر، و يعشش في مستعمرات صغيرة. في الطيران يتميز بلون الجسم الداكن المتباين مع لون الجناحين و الذيل الأبيض. هو طائر خجول ينشط ليلا"، و يتغذى على الأسماك و الكاندات المانية الأخرى.



ينقب الأرض بمنقار ه الطويل بحثًا عن الديدان و الحشر ات فيقضمي بذلك على العديد من الطفيليات الضارة بالزراعة و لذلك فهو محمى بالقانون. يضم ريشات تاجه إذا أز عج



الطول 86 سم. مهاجر شتوى. إكتسب اسمه من

شكل منقار ه. عند بحثه عن الغذاء يغمس منقار ه

نصف مفتوح في الماء يحركه يمينا ً و يسارا ً


متحسسا فرآنسه من الأحياء المانية.

Hoopoe



Platalea leucorodia

Spoonbill













Greater flamingo

فى المياة المالحة حيث يجد غذاءه من الطحالب و اللافقريات الدقيقة التي يصفيها من الماء مستخدما" منقار ه في وضع مقلوب.




Phoencopterus ruber

الطول 130 سم. زائر شتوي. يفضل المعيشة





Rock dove















The green cormer concept

田町

1. 1.

L

LEVIN IL





1.6

1 Cart





Endemic local species (species found only in one geographical area) with a very limited distribution.

These are very vulnerable to local habitat disturbance or human development.

A (H1N1





























































































If we were able to do all this here at Lake Qarun then we can do it all over Egypt. Together we can make a great difference